

**Boro totalmente
complejado
con etanolamina**

DEFENDER
B

COMPOSICIÓN	% p/p	% p/v
Boro(B)*	11,0	15,0
*Boro complejado por monoetanolamina		
Solubilidad en agua a 20° C: 100% pH: 8 Densidad a 20° C: 1360 g/L		
CONTENIDO EN METALES PESADOS: Arsénico (As) < 5 mg/kg; Cadmio (Cd) < 0,5 mg/kg; Mercurio (Hg) < 0,5 mg/kg; Plomo (Pb) < 0,5 mg/kg		

CONTENIDO: 5l

BOAMERICA

BORO TOTALMENTE COMPLEJADO CON ETANOLAMINA

DEFENDER
B

CARACTERÍSTICAS:

El boro es un microelemento esencial en el metabolismo de la planta, interviene en la absorción y metabolismo del calcio acumulándose en la pared celular unido a las pectinas, confiriendo elasticidad y firmeza a los tejidos. DEFENDER BORO trabaja en el metabolismo glucídico, participa en el proceso de elongación del tubo polínico, fecundación y cuaja de frutos, aumentando el potencial productivo del huerto.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS l/ha	CONCENTRACIÓN cc/100 l	OBSERVACIONES
Olivos, Paltos, Cítricos, Arándanos, Frutillas, Frambuesas	En floración, desarrollo de frutos y post-cosecha.	1,0-3,0	80-150	Se recomienda aplicarlo junto a Defender Calcio . Aplicar con hojas activas. Para aplicaciones en mezcla con calcio, usar dosis de 30 a 50 cc/100l.
	Desde botón floral.			
Pomáceas, Kiwis	De inicio de crecimiento de frutos.			
	Post cosecha temprana.			
Carozos, Cerezos	Desde botón floral.			
	Desde caída de pétalos en adelante.			
Uva	Post cosecha temprana.	0,75-1,0	100-150	Aplicar junto a Defender Zinc . Repetir a los 20 días. Repetir a los 20 y 40 días. Realizar 2 aplicaciones cada 12 días. Repetir a los 15 y 30 días. Ideal combinar esta aplicación con Defender Calcio . Repetir cada 7 días
	De racimo expuesto a inicio de floración.			
Trigo	De inicio de crecimiento de bayas a pintas.			
	De inicio de pinta a pre-cosecha.			
Maíz	Inicio de aparición de la espiga.			
	Inicio de emisión de seda.			
Remolacha	A partir de 4-6 hojas verdaderas.	0,75-1,0	100-150	Aplicar junto a Defender Zinc . Repetir a los 20 días. Repetir a los 20 y 40 días. Realizar 2 aplicaciones cada 12 días. Repetir a los 15 y 30 días. Ideal combinar esta aplicación con Defender Calcio . Repetir cada 7 días
Raps	Estado de roseta e inicio de flor.			
Apio	Iniciar aplicaciones con 30 cm de altura de planta.			
Tomates y pimientos	Inicio de floración.			
Melón, Sandía, Zapallo				

OBSERVACIONES:

No aplicar en horas de máxima temperatura y radiación solar.
No sobrepasar las dosis recomendadas.

PRECAUCIONES:

Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35 °C.
Manténgase alejado de los niños.
Manténgase lejos de alimentos bebidas y pienso.

ADVERTENCIAS:

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDADES:

Es compatible con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios.
No se recomienda su aplicación conjunta con sulfato de manganeso, sulfato de zinc y productos de reacción alcalina.

AGITAR ANTES DE USAR.

FECHA DE CADUCIDAD:

5 Años desde la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver información en el envase.

CONTENIDO: 5l

IMPORTADOR:

BIOAMERICA

BIOAMERICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FABRICADO POR:

 **FUTURECO
BIOSCIENCE**

FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadi, 19-23, Pl. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola, Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com