

**Fósforo y Magnesio
de rápido efecto**

FOSFIMAX
Mg

COMPOSICIÓN	% p/p	% p/v
Fósforo (P_2O_5)	40,0	56,8
Magnesio (MgO)	10,0	14,2
Densidad a 20°C: 1420 g/L pH al 1% a 20°C: 2,22 Solubilidad a 20°C: 100%		
CONTENIDO EN METALES PESADOS: Cadmio (Cd) $\leq$ 0,5 mg/kg; Cromo (Cr) $\leq$ 5 mg/kg; Plomo (Pb) $\leq$ 5 mg/kg; Mercurio (Hg) $\leq$ 0,5 mg/kg; Arsénico (As) $\leq$ 10 mg/kg.		

CONTENIDO: 20 l

BOAMERICA

FÓSFORO Y MAGNESIO DE RÁPIDO EFECTO



CARACTERÍSTICAS:

Bioestimulante desarrollado para la prevención y corrección de carencias de fósforo y magnesio, que funciona como activador de las plantas. FOSFIMAX Mg aporta a la planta una alta cantidad de magnesio, el principal constituyente de la molécula de clorofila, lo que optimiza la fotosíntesis. El magnesio mejora la absorción de otros elementos como el fósforo y actúa como activador enzimático. FOSFIMAX Mg aporta a la planta un alto contenido de fósforo en forma de ión fosfórico. FOSFIMAX Mg tiene acción sistémica: se absorbe rápidamente y se distribuye a todas las partes de la planta.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	CONCENTRACIÓN cc/100l	OBSERVACIONES
Hortalizas	200 - 300	Hacer la primera aplicación al momento de transplante. Hacer entre 2 y 4 aplicaciones adicionales durante el ciclo del cultivo.
Vides y Kiwis		Aplicar al inicio de actividad vegetativa y repetir 3-4 aplicaciones a lo largo del cultivo a intervalos de 15-20 días.
Berries (Arándanos, Frambuesas, Frutillas, etc...)		Aplicar en prefloración, cuajado y desarrollo de frutos.
Pomáceas, Carozos, Cerezos, Nogales, Avellanos		Aplicar en prefloración, cuajado y desarrollo de frutos.
Paltos y Cítricos		Aplicar al inicio de la actividad vegetativa, prefloración y desarrollo de frutos.
Industriales	300 - 500	Repartir un mínimo de 3-4 aplicaciones a lo largo del cultivo.

MODO DE EMPLEO:

Realizar aplicaciones foliares usando suficiente agua para cubrir el cultivo o bien diluir en el agua de riego.

COMPATIBILIDAD:

FOSFIMAX Mg es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas excepto con dicofol, dimetoato, aceites y productos cúpricos. Para aplicación con fitosanitarios, observar las recomendaciones de mezcla del fabricante, y si es posible hacer una prueba de compatibilidad en un volumen pequeño.

ADVERTENCIAS:

Toda la información recogida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

IMPORTADOR:



BIOAMERICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FABRICADO POR:



FUTURECO
BIOSCIENCE

FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola, Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com

PRECAUCIONES:

Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

AGITAR ANTES DE USAR.

FECHA DE CADUCIDAD:

5 años desde la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver información en el envase.

CONTENIDO NETO: 20 l

