

ZOBERAMINOL 80 SP

FERTILIZANTE FOLIAR

INGREDIENTE	% (p/p)
Nitrógeno (N) total	15
Nitrógeno (N) orgánico	14
Aminoácidos totales	87,5
Carbono orgánico	40

COMPOSICIÓN FISCOQUÍMICA	
Densidad a 20°C:	1010 g/L
pH al 1,0% a 20°C:	7,1
Solubilidad a 20 °C:	100%

Metales pesados:

Cadmio (Cd) <0,5 mg/kg; Mercurio (Hg) <0,5 mg/kg;
Plomo (Pb) <0,5 mg/kg; Arsénico (As) <0,5 mg/kg

Formulación Polvo Soluble (SP)

Modo de Acción Absorción Foliar

Contenido: **1 kg**

BOAMERICA

ZOBERAMINOL 80 SP



Absorción
Foliar



Solubles en
Agua

CARACTERÍSTICAS:

ZOBERAMINOL 80 SP es un fertilizante foliar con acción bioestimulante que aporta una alta concentración de aminoácidos en una formulación de polvo soluble que se disuelve fácilmente en agua para su posterior aplicación. ZOBERAMINOL 80 SP potencia su desarrollo y aumenta la productividad. En mezclas con fitosanitarios, potencia su eficiencia e incrementa los efectos de los extractos de alga.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	APLICACIÓN	Dosis kg/ha	Concentración gr/100 l
Uva de Mesa	2 aplicaciones en brotación y 2 en crecimiento de bayas.	0,5 - 1,0	50 - 100
Uva Vinífera	2 aplicaciones en brotación y 1 en pinta.		
Cítricos y Paltos	3 aplicaciones: 2 semanas antes de floración, cuaje y crecimiento de los frutos.		
Carozos, Nogales	4 aplicaciones: en brotación, cuajado, raleo y desarrollo de fruto.		
Manzanos, Perales y Kiwis	En brotación, crecimiento de frutos y post cosecha.		
Arándano, Frambuesa y Frutilla	En brotación, crecimiento de frutos y post cosecha.		
Olivo	3 aplicaciones en el crecimiento de los frutos.		
Huertos en formación y Viveros	Cada 15 a 20 días desde inicio de brotación.	0,25 - 1,0	
Papa	4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo.		
Arroz, Trigo y Cebada	2 aplicaciones: Inicio de macolla y llenado de grano. Durante todo el ciclo de cultivo.		
Alfalfa	Después del segundo corte. Aplicar 7-10 días después de cada corte. 2 a 3 aplicaciones.		
Hortalizas y Tomate de Industria	1 Aplicación cada 20 días.		
Tomate	3 - 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo.		
Melón y Sandía	3 aplicaciones antes de floración y 2 en el crecimiento de los frutos.		

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Aplicar vía foliar: Utilizar suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas, sin sobrepasar el punto de goteo. ZOBERAMINOL 80 SP es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas y fitohormonales.

PRECAUCIONES:

Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35 °C.
Manténgase alejado de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

ADVERTENCIAS:

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).

El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, Etc.) por inobservancia total o parcial de esta etiqueta. Evite aplicaciones con temperaturas extremas.

DATOS DEL IMPORTADOR
BIOAMERICA S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2, Paine, Santiago - Chile
info@bioamerica.cl - www.bioamerica.cl

BIOAMERICA

N° DE LOTE: PRO0409
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

