

FOSFIMAX

Cu

Contenido: 1 l



CARACTERÍSTICAS:

FOSFIMAX Cobre es una fuente concentrada de Fósforo, Potasio especialmente recomendado para los momentos de máxima necesidad de estos macronutrientes. FOSFIMAX Cobre además aporta cobre para favorecer la utilización del nitrógeno, la síntesis de proteínas y ayuda a corregir las deficiencias de este elemento.

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD:

FOSFIMAX Cu es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, excepto con dicofol, dimetoato, aceites y productos basados en cobre. Para aplicación con fitosanitarios, observar las recomendaciones de mezcla del fabricante y, si es posible, hacer una prueba de compatibilidad en un volumen pequeño.

ADVERTENCIAS:

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

PRECAUCIONES:

Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C
Manténgase fuera del alcance de los niños
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver información en el envase

CADUCIDAD:

5 años a partir de la fecha de fabricación

IMPORTADOR:



BIOAMERICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 60, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FABRICADO POR:



FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadi, 19-23, Pl. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola, Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com

COMPOSICIÓN:

INGREDIENTE	% (p/p)	(%p/v)
Fósforo (P ₂ O ₅)	23,0	34,0
Potasio (K ₂ O)	20,0	30,0
Cobre (Cu)	2,6	2,8

Densidad a 20°C: 1460 g/L

pH al 1% a 20°C: 6,1

Solubilidad a 20°C: 100%

APLICACIONES RECOMENDADAS:

CULTIVO	Momento de Aplicación	Dosis kg/ha	Concentr. cc/100 l	Observac.		
Uva	Desde cierre de racimo en adelante	1,5 - 2,0	100 - 150	Aplicar como parte de la estrategia de rotación. Se puede aplicar durante la cosecha.		
Cerezos	Desde yema algodonosa en adelante			Aplicar en flor, cuajado, crecimiento inicial del fruto, poscosecha y con presencia de heladas		
Manzanos, Perales	Desde yema hinchada			Aplicar en flor, cuajado y con presencia de heladas		
Arándanos, Frambuesas, Frutillas	Desde inicio de brotación	1,0 - 1,5		Aplicar preventivamente como parte de la estrategia de rotación. Se puede aplicar durante la cosecha		
Paltos	Desde precosecha	2,0 - 3,0		Aplicar durante floración y cuaja		
Nogales, Almendros	Desde inicio de brotación	1,5 - 2,0				
Olivos	Desde inicio de brotación	1,5 - 2,0				
Vivero	Desde yema hinchada	1,0 - 1,5		Aplicar cada 15-20 días		
Tomate indeterminado	Desarrollo vegetativo	0,5 - 1,0		Aplicar cada 10 a 12 días al aparecer los primeros síntomas repliendo a los 7 días		
	Desde crecimiento de fruta a cosecha	1,0 - 1,5				
Tomate determinado	Desarrollo vegetativo a cosecha	0,5 - 1,0				
Melón, Sandía	Crecimiento de fruta a cosecha					
Coliflores, Brócolis, Ajos, Cebollas, Papas, Alcachofas, Apio, Lechuga	Durante todo el cultivo					