# Fósforo procedente del anión fosfito



COMPOSICIÓN	% p/p	% p/v
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) *	40,0	59,6
Potasio (K <sub>2</sub> O)	20,0	29,8

Solubilidad en agua a 20° C: 100% pH: 2,25 Densidad a 20° C: 1490 g/L \* Fósforo equivalente a 639 g/L de fosfito.

CONTENIDO EN METALES PESADOS:

Cadmio (Cd)  $\leq$  0,5 mg/kg; Cromo(Cr)  $\leq$  10 mg/kg; Plomo(Pb)  $\leq$  5 mg/kg; Mercurio(Hg)  $\leq$  0,5 mg/kg; Arsénico(As) < 100 mg/kg.

CONTENIDO: 20 |



# FÓSFORO PROCEDENTE DEL ANIÓN FOSFITO

# **CARACTERÍSTICAS:**

FOSFIMAX 40-20 es una solución de fósforo y potasio, en la que todo el fósforo procede del anión fosfito. Se transloca tanto en sentido ascendente como descendente. La elevada riqueza en fósforo hace de FOSFIMAX 40-20 un producto idóneo para su empleo durante todo el ciclo de cultivo y particularmente para los momentos de fructificación por su elevada concentración en potasio.



# **RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVO				
Cítricos	3,0-5,0	200-300	Iniciar las aplicaciones si las condiciones son favorables, cada 20 a 30 días.	
Carozos, Cerezos, Pomáceas			Aplicar al menos dos veces por cada flush de crecimiento radicular o durante el ciclo completo del cultivo.	
Paltos	6,0-10,0			
Nogal	3,0-4,0	120-150		
Frambuesa, Arándano, Frutilla	2,0-4,0	200-300		
Uva, Kiwis	3,0-5,0		Aplicar con brotes de 20-30 cm y repetir a los 12 a 15 días.	
Manzano	3,0-5,0		Aplicar 45, 30 y 15 días de cosecha y/o después de cada Iluvia.	
Papa	3,0-4,0		Desde plantas con 30 cm de altura.	
Cebolla, Ajo			Aplicar en almaciguera desde 2 hojas verdaderas, al trasplante y repetir cada 7 a 10 días.	
Tomate, Pimiento Melón, Sandia, Zapallo, Repollo, Coliflor, Brócoli, Lechuga	1,0-3,0	400-500		
Maiz	1,0-1,5		Desde 3 - 4 hojas.	

Se aplica durante todo el ciclo de cultivo.

# **COMPATIBILIDADES:**

FOSFIMAX 40-20 es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, excepto con hidróxidos de zinc, dicofol, dimetoato, aceites y productos cúpricos. No obstante, puede ser aplicado una semana antes o tres después del empleo de aceites o fungicidas cúpricos.

# **ADVERTENCIAS:**

Toda la información recogida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

#### PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado de alimentos bebidas y pienso: Lavarse las manos depués de la aplicación. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.

# **FECHA DE CADUCIDAD:**

5 años desde la fecha de fabricación.

### LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver información en el envase.

**CONTENIDO NETO: 20 I** 

**IMPORTADOR:** 



BIOAMERICA, S.A.

Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2 Paine, Santiago – Chile

Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl

www.bioamerica.cl

FABRICADO POR:



**FUTURECO BIOSCIENCE S.A.** 

Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta 08799 Olerdola. Barcelona - España www.futurecobioscience.com corporation@futurecobioscience.com