

Fósforo de Zinc de rápida
asimilación

FOSFIMAX
Zn

| COMPOSICIÓN | % p/p | % p/v |
|--|---|-------|
| Fósforo (P ₂ O ₅) | 20,0 | 24,2 |
| Zinc | 5,0 | 6,05 |
| Densidad a 20°C: | 1210 g/L | |
| pH: | 2 | |
| Solubilidad en agua a 20°C: | 100% | |
| Contenido en metales pesados: | Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo (Cr<) ≤ 5 mg/kg; Plomo (Pb) ≤ 5 mg/kg; Mercurio (Hg) ≤ 0,5 mg/kg; Arsénico (As) ≤ 15 mg/kg | |

CONTENIDO: 5 l

 BOAMERICA

FÓSFORO DE ZINC DE RÁPIDA ASIMILACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

FOSFIMAX ZINC es un producto desarrollado para la prevención y corrección de carencias de Zinc, favorece el desarrollo radicular y mejora los procesos de floración, cuajado y maduración de los frutos. FOSFIMAX ZN tiene acción sistémica, se absorbe rápidamente y se distribuye a todas las partes de la planta.



RECOMENDACIONES DE USO:

| CULTIVO | CONCENTRACIÓN cc/100 l | OBSERVACIONES |
|---|---------------------------|---|
| Vides y Kiwis | | Aplicar en pre-floración y repetir 3-4 aplicaciones a lo largo del cultivo, a intervalos de 15-20 días. |
| Pomáceas | 100-150 | Aplicar en pre-floración, cuajado y desarrollo de frutos. |
| Duraznos, Nectarinas, Almonds, Ciruelos y Cerezos | | Aplicar en post-cosecha y 20 días después. |
| Nogales y Avellanos | 50 | Aplicar desde febrero cada 20 días. |
| Paltos y Cítricos | | Aplicar a fines del verano y repetir cada 15-20 días. |
| Berries (Arándanos, Frambuesas, Frutillas) | | Aplicar en post-cosecha y 20 días después. |
| Hortalizas | 100-150 | Repartir un mínimo de 3-4 aplicaciones cada 15-20 días a lo largo del cultivo. |
| Industriales | | Repartir un mínimo de 3-4 aplicaciones a lo largo del cultivo. |
| Cereales | 300 | Repartir un mínimo de 4 aplicaciones cada 15-20 días a lo largo del cultivo. |

COMPATIBILIDAD:

FOSFIMAX Zn es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, excepto con diafotol, dimetato, aceites y productos cúpricos. Para aplicación con fitosanitarios, observar las recomendaciones de mezcla del fabricante, y si es posible hacer una prueba de compatibilidad en un volumen pequeño.

PRECAUCIONES:

Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

ADVERTENCIAS:

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas


FECHA DE CADUCIDAD:

5 años desde la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver información en el envase.

CONTENIDO NETO: 5 l



IMPORTADOR:

BIOAMERICA

BIOAMERICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago - Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FABRICADO POR:



FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadi, 19-23, Pl. Sant Pere de Molana
08799 Olerdola, Barcelona - España
www.futurecobiosciences.com
corporation@futurecobiosciences.com