

DEFENDER® FÓSFORO

Grupo: Correctores Nutricionales

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ✓ Aporta fósforo instantáneo a toda la planta
- ✓ Mejora la calidad de la fruta desde etapas tempranas de crecimiento
- ✓ Aporta potasio y micronutrientes (boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc)

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
Fósforo (P ₂ O ₅)	20,0	24,6
Potasio (K ₂ O)	5,0	6,1
Boro (B)	0,05	0,06
Cobre (Cu)	0,02	0,03
Hierro (Fe)	0,02	0,03
Manganeso (Mn)	0,02	0,03
Molibdeno (Mo)	0,01	0,01
Zinc (Zn)	0,02	0,03

*Fósforo complejado con EDTA

Solubilidad a 20°C: 100%

pH: 2,76

Densidad a 20°C: 1230 g/L

Formulación Concentrado Soluble - SL

Modo de Acción Absorción foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DEFENDER FÓSFORO es un corrector nutricional a base de fósforo complejado y potasio enriquecido con microelementos. Está formulado especialmente para mejorar los niveles foliares de los elementos y la calidad de los frutos en uva de mesa, manzana, cerezos, arándanos, etc.

DEFENDER FÓSFORO contiene moléculas coadyuvantes que hacen estable la formulación y facilitan la absorción foliar del fósforo y potasio.

DEFENDER FÓSFORO está formulado como concentrado soluble, con pH ácido lo que significa que el fósforo y el potasio están en una forma 100% soluble y por lo tanto 100% disponible, su óptima calidad garantiza una aplicación limpia sin residuos o depósitos.



DEFENDER® FÓSFORO

RECOMENDACIONES DE USO

ESPECIE	CONCENTRACIÓN cc/100 L	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Vides, Kiwis	300 - 400	2 - 4	Aplicar desde cuaja, repetir cada 15 días hasta 20 días antes de la cosecha.
Nogales, Avellanos		3 - 4	Aplicar con frutos cuajados y ante síntomas de carencia.
Pomáceas, Carozos, Cerezos		2 - 5	Aplicar desde fin de caída de pétalos, repitiendo cada 15 días, hasta 2 a 3 semanas antes de la cosecha.
Paltos, Cítricos		3 - 5	Aplicar desde después de cuaja, cada 15 días hasta un mes antes de la cosecha.
Arándanos, Frambuesos, Frutillas		1 - 2	Aplicar desde inicio de floración, repetir cada 7 a 10 días.
Hortalizas			Aplicar según requiera la corrección de deficiencias o para mejorar el color y calidad de frutos. Cada 10 - 15 días.
Papas			Aplicar a los 30 días después de la siembra y repetir cada 15 - 20 días, o antes si aparecen síntomas de carencias de fósforo.

Vía riego usar 3 a 6 L/ha

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

DEFENDER FÓSFORO se aplica mediante aspersion foliar utilizando suficiente agua para mojar bien todo el follaje de las plantas. Es compatible con equipos pulverizadores, electrostáticos y aéreos (incluyendo drones). DEFENDER FÓSFORO es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, no obstante se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. No se recomienda mezclar con abonos de elevado contenido en fosfatos. Ante mayores dudas, consultar al Departamento Técnico de Bioamerica.

ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.



DEFENDER® FÓSFORO

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C

PRESENTACIÓN

Envases: 5 - 20 L

