

FOSFIMAX® 60-40 SP

Grupo: Bioestimulantes

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ✓ Promueve un desarrollo productivo integral
- ✓ Revitaliza plantas debilitadas
- ✓ Recupera a la planta ante condiciones de estrés biótico

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)
*Fósforo (P_2O_5)	58
Potasio (K_2O)	38

*Fósforo equivalente a 670 g de fosfitos por kg de producto

Solubilidad a 20°C: 100%

pH: 6


Densidad a 20°C: 650 g/L

Formulación Polvo Soluble - SP
Modo de Acción Absorción foliar y radicular

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

FOSFIMAX 60-40 SP es un bioestimulante en formato de polvo soluble en base a altas concentraciones de fósforo y potasio. Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de recuperar y fortalecer a la planta ante situaciones de estrés biótico. El fósforo que contiene FOSFIMAX 60-40 SP procede del anión fosfito y se encuentra en forma reducida (H_2PO_3). Esto hace efectiva la activación del metabolismo vegetal que permite revitalizar y asegurar un mejor desarrollo en plantas debilitadas. El uso de FOSFIMAX 60-40 SP es ideal durante todo el ciclo de cultivo, particularmente en los momentos de fructificación, gracias a su elevada concentración de potasio. Por otra parte, el 85% de la penetración de FOSFIMAX 60-40 SP al tejido vegetal ocurre en menos de 30 minutos, reduciendo la posibilidad de pérdidas por lavado de lluvias.


FOSFIMAX 60-40 SP tiene una alta calidad de formulación, no deja depósitos sobre los órganos aplicados y el 100% del fósforo y potasio vienen disponibles para el aprovechamiento de la planta. Además, su formulación SP permite disminuir costos de transporte y almacenaje.



FOSFIMAX® 60-40 SP

RECOMENDACIONES DE USO

ESPECIE	CONCENTRACIÓN g/100 L	DOSIS kg/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Uva de mesa, Uva vinífera y Kiwis	50 - 100	1 - 2 Vía foliar 2 - 4 Vía riego	Con brotes de 20 a 30 cm, repetir a los 15 días. Y en postcosecha.
Manzanos			45,30 y 15 días antes de la cosecha y después de cada lluvia.
Perales			En brotación repetir a los 15 días, y en postcosecha.
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Durazneros y Almendros			En postcosecha, repetir a los 15 y 30 días.
Nogales y Avellanos			Desde brotación repetir a los 20 y 30 días, y en postcosecha.
Paltos		2 - 4 Vía foliar 4 - 6 Vía riego	Aplicar en huertos afectados con condiciones predisponentes, cada 15 días.
Naranjos, Mandarinos y Limones			Desde fines de verano o con condiciones predisponentes, repetir cada 20 a 30 días.
Olivos		1 - 2 Vía foliar 2 - 4 Vía riego	Desde postfloración hasta otoño.
Arándanos, Frambuesas y Frutillas		0.5 - 2 Vía foliar 1 - 4 Vía riego	En postcosecha, repetir a los 20 días.
Tomate, Pimiento y Pepino	50 - 100	0.5 - 1 Vía foliar 1 - 2 Vía riego	En almaciguera desde 2 hojas verdaderas al trasplante, repetir cada 7 a 10 días.
Melón, Sandía y Zapallo			
Cebolla y Ajo			
Apio, Lechuga y Espinaca		1 - 2 Vía foliar	Desde plantas con 4 a 6 hojas verdaderas, repetir cada 15 días. Durante todo el ciclo del cultivo, repartir 3 a 4 aplicaciones.
Papa			
Trigo y Avena			
Maíz, Alfalfa, Remolacha, Raps y Praderas			



FOSFIMAX® 60-40 SP

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

FOSFIMAX 60-40 SP se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas. Es compatible con equipos pulverizadores, electrostáticos y aéreos (incluyendo drones). Al realizar aplicaciones vía dron se debe prediluir antes de incorporar al estanque. También se puede aplicar vía riego.

FOSFIMAX 60-40 SP es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados. No obstante, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. No se debe mezclar con productos cálcicos, dicofol, dimetoato, aceites ni cobres. Es recomendable evitar mezclas con productos formulados como emulsiones concentradas. Ante mayores dudas, consultar al Departamento Técnico de Bioamerica.

ADVERTENCIAS

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición, estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones climáticas de la localidad, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C

PRESENTACIÓN

Envases: 1 - 10 kg

